

Les décès dus au cancer du col utérin, causés par le virus du papillome humain (HPV), ont doublé au Maroc entre 2012 et 2018.



## Le problème

Les taux d'infection par le HPV augmentent, avec aucun outil de prévention efficace actuellement mis en place.



## Prévalence de l'HPV

Entre 3.3% et 13.9% des femmes au Maroc ont le HPV.



## Solution

La vaccination et le dépistage peuvent prévenir les cancers et les verrues génitales liés à l'HPV. L'âge recommandé par l'OMS est entre 9 et 13 ans, mais peut être administré jusqu'à l'âge de 45 ans. Les dépistages sont conseillé à partir de 30 ans.




## Classement

Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au Maroc.



## Taux de cancer du col utérin

En 2018 au Maroc, il y a eu environ 3.388 cas de cancer du col utérin et 2.465 décès par le cancer du col utérin. Le taux de décès a doublé depuis 2012, où il y avait 1.076 morts.



Si aucune mesure sérieuse n'est prise, les décès par le cancer du col de l'utérus devraient **doubler** d'ici 2040.



Les vaccins contre le HPV sont une invention merveilleuse. Notre défi consiste à nous assurer que toutes les filles du monde soient vaccinées contre le HPV et que chaque femme de plus de 30 ans soit dépistée et traitée pour des lésions précancéreuses.

- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS